



## PICADAR

Dotazník pro děti s podezřením na PCD

<b>Má pacient každodenní vlhký kašel od raného dětství?</b>	<b>Ano - pokračujte v PICADAR</b>	
	<b>Ne - STOP. PICADAR nebyl vytvořen pro pacienty bez vlhkého kašle</b>	
<b>Byl pacient narozen v termínu nebo předčasně?</b>	V termínu	2
<b>Měl pacient v novorozeneckém období plicní obtíže (např. tachypnoe, kašel, pneumonii)?</b>	Ano	2
<b>Byl pacient přijat na novorozeneckou intenzivní péči?</b>	Ano	2
<b>Má pacient <i>situs viscerum inversus</i> nebo jinou heterotaxii?</b>	Ano	4
<b>Má pacient vrozenou vývojovou vadu srdce?</b>	Ano	2
<b>Má pacient celoroční perzistentní rýmu?</b>	Ano	1
<b>Trpí pacient chronickými ušními obtížemi nebo problémy se sluchem (např. serózní otitis media, porucha sluchu, perforace bubínku)?</b>	Ano	1
	<b>součet</b>	<b>bodů</b>

Při použití hodnoty 5 a více bodů jako hraniční hodnoty pro hodnocení positivity je dosaženo 90% senzitivity.

*Behan, L., Dimitrov, B. D., Kuehni, C. E., Hogg, C., Carroll, M., Evans, H. J., ... Lucas, J. S. (2016). PICADAR: a diagnostic predictive tool for primary ciliary dyskinesia. The European Respiratory Journal, 47(4), 1103–1112. <https://doi.org/10.1183/13993003.01551-2015>*